

癌種	プロトコル名	レジメン内容	注意事項	催吐リスク	イメンド	内服デカドロン
大腸癌	Bev.+FOLFIRI (SV2.5)	アバスチン注 5mg/kg or10mg/kg 点滴 day 1 レボホリナート注 200mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 イリリ注 150mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU(bolus) 400mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU(ポンプ) 2400mg/m <sup>2</sup> 46時間 day 1 【1コース2週】	アバスチンは初回投与90分、忍容性が良好であれば 2回目60分、それ以降30分での投与可	中等度	◎ (注射)	8T/day2-4
大腸癌	Bev.+mFOLFOX6 (SV2.5)	アバスチン注 5mg/kg or10mg/kg 点滴 day 1 レボホリナート注 200mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 オキサリプラチン注 85mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU(ポンプ) 2400mg/m <sup>2</sup> 46時間 day 1 【1コース2週】	アバスチンは初回投与90分、忍容性が良好であれば 2回目60分、それ以降30分での投与可	中等度		
大腸癌	Bev.+XELOX	アバスチン注 7.5mg/kg 点滴 day 1 オキサリプラチン注 130mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 セロニダ 2000mg/m <sup>2</sup> /day 経口 day 1~14 【1コース3週】	アバスチンは初回投与90分、忍容性が良好であれば 2回目60分、それ以降30分での投与可 <b>●セロニダ⇒2週間投薬、1週間休薬</b>	中等度		
大腸癌	Bev.+Cape	アバスチン注 7.5mg/kg 点滴 day 1 セロニダ 2000mg/m <sup>2</sup> /day 経口 day1~14 【1コース3週】	アバスチンは初回投与90分、忍容性が良好であれば 2回目60分、それ以降30分での投与可 <b>●セロニダ⇒2週間投薬、1週間休薬</b>	軽度		
大腸癌	Bev.+UFT/LV	アバスチン注 5mg/kg 点滴 day 1・15 ユーエフティー 30mg/m <sup>2</sup> /day 経口 day1~21 ユーゼル 75mg/day 経口 day1~21 (1日3回食事の前後1時間は避けて) 【1コース4週】	アバスチンは初回投与90分、忍容性が良好であれば 2回目60分、それ以降30分での投与可 <b>●UFT/LV⇒3週間投薬、1週間休薬</b>	軽度		
大腸癌	Bev.+TS-1	アバスチン注 5mg/kg 点滴 day 1・15・29 S-1 80mg,100mg,120mg/day 経口 day 1~28 【1コース6週】	アバスチンは初回投与90分、忍容性が良好であれば 2回目60分、それ以降30分での投与可 <b>●S-1⇒4週間投薬、2週休薬</b>	軽度		
大腸癌	Bev.+sLV5FU2 (SV2.5)	アバスチン注 5mg/kg or10mg/kg 点滴 day 1 レボホリナート注 200mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU(bolus) 400mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU(ポンプ) 2400mg/m <sup>2</sup> 46時間 day 1 【1コース2週】	アバスチンは初回投与90分、忍容性が良好であれば 2回目60分、それ以降30分での投与可	軽度		
大腸癌	Bev.+SOX(大腸癌)	アバスチン注 7.5mg/kg 点滴 day1 オキサリプラチン注 130mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 S-1 80mg、100mg、120mg/day 経口投与 day1~14 【1コース3週】	<b>●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬</b>	中等度		

大腸癌	<b>Cet.+CPT-11 (初回用)</b>	<p>アービタックス注 400mg/m<sup>2</sup> (初回投与時) 250mg/m<sup>2</sup> (2回目以降投与時) 点滴 day1.8 リリナカン注 150mg/m<sup>2</sup> 点滴 day1 【1コース2週】</p>	中等度	◎ (注射)	8T/day2-4
大腸癌	<b>Cet.+CPT-11 (2回目以降)</b>	<p>アービタックス注 400mg/m<sup>2</sup> (初回投与時) 250mg/m<sup>2</sup> (2回目以降投与時) 点滴 day1.8 リリナカン注 150mg/m<sup>2</sup> 点滴 day1 【1コース2週】</p>	中等度	◎ (注射)	8T/day2-4
大腸癌	<b>Cet.+FOLFIRI (SV2.5) (初回用)</b>	<p>アービタックス注 400mg/m<sup>2</sup> (初回投与時) 250mg/m<sup>2</sup> (2回目以降投与時) 点滴 day1.8 レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup> 点滴 day1 リリナカン注 150mg/m<sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU (bolus) 400mg/m<sup>2</sup> 5-FU (ポンプ) 2400mg/m<sup>2</sup> 46時間 day1 【1コース2週】</p>	中等度	◎ (注射)	8T/day2-4
大腸癌	<b>Cet.+FOLFIRI (SV2.5) (2回目以降)</b>	<p>アービタックス注 400mg/m<sup>2</sup> (初回投与時) 250mg/m<sup>2</sup> (2回目以降投与時) 点滴 day1.8 レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup> 点滴 day1 リリナカン注 150mg/m<sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU (bolus) 400mg/m<sup>2</sup> 5-FU (ポンプ) 2400mg/m<sup>2</sup> 46時間 day1 【1コース2週】</p>	中等度	◎ (注射)	8T/day2-4
大腸癌	<b>Cet.+mFOLFOX6 (SV2.5) (初回用)</b>	<p>アービタックス注 400mg/m<sup>2</sup> (初回投与時) 250mg/m<sup>2</sup> (2回目以降投与時) 点滴 day1.8 レボホリナート注 200mg/m<sup>2</sup> 点滴 day1 オキサリプラチン注 85mg/m<sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU (ポンプ) 2400mg/m<sup>2</sup> 46時間 day1 【1コース2週】</p>	中等度		

大腸癌	Cet.+mFOLFOX6 (SV2.5) (2回目以降)	アービタックス注 400mg/m <sup>2</sup> (初回投与時) 250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降投与時) 点滴 day1.8 レボホリナート注 200mg/m <sup>2</sup> 点滴 day1 オキサリプラチン注 85mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU (ポンプ) 2400mg/m <sup>2</sup> 46時間 day1 【1コース2週】		中等度		
大腸癌	CPT-11(大腸癌)	イリリカ注 150mg/m <sup>2</sup> 点滴 day1.15 【1コース 5週】		中等度	☉ (注射)	8T/day2-4
大腸癌	FOLFIRI (SV2.5)	レボホリナート注 200mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 イリリカ注 150mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU注 (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m <sup>2</sup> 46時間 day 1 【1コース2週】		中等度	☉ (注射)	8T/day2-4
大腸癌	FOLFIRI(急速静注なし) (SV2.5)	レボホリナート注 200mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 イリリカ注 150mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m <sup>2</sup> 46時間 day 1 【1コース3週】		中等度	☉ (注射)	8T/day2-4
大腸癌	IRIS (大腸癌)	イリリカ注 150mg/m <sup>2</sup> 点滴 day1.15 S-1 80mg/m <sup>2</sup> /日 経口投与 day1~14 【1コース 4週】	●S-1⇒2週間投薬、2週間休薬	中等度	☉ (注射)	8T/day2-4
大腸癌	mFOLFOX6 (SV2.5)	レボホリナート注 200mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 オキサリプラチン注 85mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m <sup>2</sup> 46時間 day1 【1コース2週】		中等度		
大腸癌	Panitumumab	ベクティビックス注 6mg/kg 点滴 day 1 【1コース2週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること	最小度		
大腸癌	Panitumumab+CPT-11	ベクティビックス注 6mg/kg 点滴 day 1 イリリカ注 150mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 【1コース2週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること	中等度	☉ (注射)	

大腸癌	Panitumumab+FOLFIRI (SV2.5)	ベクティビックス注 6mg/kg 点滴 day 1 レボホリナート注 200mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 リリチカ注 150mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU注 (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m <sup>2</sup> 46時間 day1 【1コース2週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること	中等度	☉ (注射)	8T/day2-4
大腸癌	Panitumumab+mFOLFOX6 (SV2.5)	ベクティビックス注 6mg/kg 点滴 day 1 レボホリナート注 200mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 オキサリプラチン注 85mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m <sup>2</sup> 46時間 day1 【1コース2週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること	中等度		
大腸癌	sLV5FU2 (SV2.5)	レボホリナート注 200mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU注 (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m <sup>2</sup> 46時間 day 1 【1コース 2週】		中等度		
大腸癌	SOX	オキサリプラチン注 130mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 S-1 80mg,100mg,120mg/day 経口投与 day1~ 14 【1コース3週】	●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬	中等度		
大腸癌	wCetuximab (初回用)	アービタックス注 400mg/m <sup>2</sup> (初回投与時) 250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降投与時) 点滴 day1 【1コース1週】		最小度		
大腸癌	wCetuximab(2回目以降)	アービタックス注 400mg/m <sup>2</sup> (初回投与時) 250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降投与時) 点滴 day1 【1コース1週】		最小度		
大腸癌	XELOX	オキサリプラチン注 130mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 セキログ錠 2000mg/m <sup>2</sup> /day 経口投与 day1~14 【1コース3週】	●セキログ⇒2週間投薬、1週間休薬	中等度		
大腸癌	RAM+FOLFIRI(SV2.5)	サイラムザ注 8mg/kg 点滴 day1 レボホリナート注 200mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 リリチカ注 150mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU注 (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m <sup>2</sup> 46時間 day1 【1コース2週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること	中等度	☉ (注射)	8T/day2-4

大腸癌	FOLFOXIRI(SV2.5)	レボホリナート注 200mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 イリリチン注 150mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 オキサリプラチン注 85mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU(ポンプ) 2400mg/m <sup>2</sup> 46時間 day1 【1コース2週】		高度	◎ (注射)	16T/day2-4
大腸癌	Bev.+FOLFOXIRI(SV2.5)	アバスチン注 5mg/kg 点滴 day 1 レボホリナート注 200mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 イリリチン注 150mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 オキサリプラチン注 85mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU(ポンプ) 2400mg/m <sup>2</sup> 46時間 day1 【1コース2週】		高度	◎ (注射)	16T/day2-4
大腸癌	XELIRI	イリリチン注 200mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 セクシゲ錠 1600mg/m <sup>2</sup> /day 経口投与 day1~14 【1コース3週】	●セクシゲ⇒2週間投薬、1週間休薬	中等度	◎ (注射)	8T/day2-4
大腸癌	Bevacizumab+XELIRI	アバスチン注 7.5mg/kg day 1 イリリチン注 200mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 セクシゲ錠 1600mg/m <sup>2</sup> /day 経口投与 day1~14 【1コース3週】	●セクシゲ⇒2週間投薬、1週間休薬	中等度	◎ (注射)	8T/day2-4
大腸癌	Aflibercept+FOLFIRI(SV2.5)	ザルトラップ注 4mg/kg 点滴 day1 レボホリナート注 200mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 イリリチン注 150mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU注 (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m <sup>2</sup> 46時間 day 1 【1コース2週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること	中等度	◎ (注射)	8T/day2-4
大腸癌	アバスチン+オキサリ	アバスチン注 5mg/kg 点滴 day1・day15 オキサリプラチン錠 35mg/m <sup>2</sup> /回 1日2回 day1-5 内服 day6-7休薬 day8-12内服 day13-28休薬	●オキサリプラチン錠 35mg/m <sup>2</sup> /回 1日2回 day1-5 内服 day6-7休薬 day8-12内服 day13-28休薬	中等度		