

癌種	プロトコル名	レジメン内容	注意事項	催吐リスク	イメンド	内服デカドロン
胃癌	CPT-11+CDDP 入院用	カンプト注 70mg/m ² 点滴 day1.15 ランダ注 80mg/m ² 点滴 day 1 【1コース4週】	day15はカンプト注のみ、 支持療法薬剤異なります。注意！	高度	◎ (注射)	16T/day2-4
胃癌	CPT-11+CDDP 外来用	カンプト注 60mg/m ² 点滴 day 1 ランダ注 30mg/m ² 点滴 day 1 【1コース2週】		高度	◎ (注射)	16T/day2-4
胃癌	IRIS (胃癌)	カンプト注 100mg/m ² 点滴 day1.15 S-1 80mg/m ² /日 経口投与 day1~14 【1コース4週】	●S-1⇒2週間投薬、2週間休薬	中等度	◎ (注射)	8T/day2-4
胃癌	RAM (胃癌)	サイラムザ注 8mg/kg 点滴 day1 【1コース2週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること	最小度		
胃癌	RAM+PTX (胃癌)	サイラムザ注 8mg/kg 点滴 day 1.15 パクリタキセル注 80mg/m ² 点滴 day 1.8.15 【1コース4週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること アルコール過敏の有無を確認すること	軽度		
胃癌	S-1+CDDP+HER (低負荷) (初回用)	ハーセプチン注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 ランダ注 60mg/m ² 点滴 day 1 S-1 80mg,100mg,120mg/日 経口投与 day1から 14 【1コース3週】	ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。 腎機能が保たれていることを確認すること。 Day2-3は1000cc以上の水分摂取をして いただく事 ●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬	高度	◎ (注射)	16T/day2-4
胃癌	S-1+CDDP+HER (低負荷) (2回目以降)	ハーセプチン注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 ランダ注 60mg/m ² 点滴 day 1 S-1 80mg,100mg,120mg/日 経口投与 day1から 14 【1コース3週】	ハーセプチンは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。 腎機能が保たれていることを確認すること。 Day2-3は1000cc以上の水分摂取をして いただく事 ●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬	高度	◎ (注射)	16T/day2-4

胃癌	S-1+CDDP+HER (初回用)	ハーセプチン注 8mg/kg (初回投与时) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 ランダ注 60mg/m ² 点滴 day 1 S-1 80mg,100mg,120mg/日 経口投与 day1から 14 【1コース3週】	ハーセプチンは初回投与时90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。 ●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬	高度	◎ (注射)	16T/day2-4
胃癌	S-1+CDDP+HER (2回目以降)	ハーセプチン注 8mg/kg (初回投与时) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 ランダ注 60mg/m ² 点滴 day 1 S-1 80mg,100mg,120mg/日 経口投与 day1から 14 【1コース3週】	ハーセプチンは初回投与时90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。 ●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬	高度	◎ (注射)	16T/day2-4
胃癌	TS-1+CDDP	ランダ注 60mg/m ² 点滴 day 8 S-1 80mg,100mg,120mg/日 day 1~21 【1コース5週】	●S-1⇒3週間投薬、2週間休薬	高度	◎ (注射)	16T/day2-4
胃癌	TS-1+CDDP (低負荷)	ランダ注 60mg/m ² 点滴 day 8 S-1 80mg,100mg,120mg/日 day 1~21 【1コース5週】	腎機能が保たれていることを確認すること。 Day9-10は1000cc以上の水分摂取をして いただく事 ●S-1⇒3週間投薬、2週間休薬	高度	◎ (注射)	16T/day2-4
胃癌	XP+triHER(胃癌) (初回用)	ハーセプチン注 8mg/kg (初回投与时) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 ランダ注 80mg/m ² 点滴 day 1 ゼロ-グ錠 2000mg/m ² /日 経口投与 day1~14 【1コース3週】	ハーセプチンは初回投与时90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。 ●ゼロ-グ⇒2週間投薬、1週間休薬	高度	◎ (注射)	16T/day2-4
胃癌	XP+triHER(胃癌) (2回目以降)	ハーセプチン注 8mg/kg (初回投与时) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 ランダ注 80mg/m ² 点滴 day 1 ゼロ-グ錠 2000mg/m ² /日 経口投与 day1~14 【1コース3週】	ハーセプチンは初回投与时90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。 ●ゼロ-グ⇒2週間投薬、1週間休薬	高度	◎ (注射)	16T/day2-4
胃癌	XP(胃癌)	ランダ注 80mg/m ² 点滴 day 1 ゼロ-グ錠 2000mg/m ² /日 経口投与 day 1~14 【1コース3週】	●ゼロ-グ⇒2週間投薬、1週間休薬	高度	◎ (注射)	16T/day2-4

胃癌	triHER(胃癌) (初回用)	ハーセプチン注 8mg/kg (初回投与时) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 【1コース3週】	ハーセプチンは初回投与时90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	最小度		
胃癌	triHER(胃癌) (2回目以降)	ハーセプチン注 8mg/kg (初回投与时) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 【1コース3週】	ハーセプチンは初回投与时90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	最小度		
胃癌	SOX(胃癌)	エルプラット注 100mg/m ² 点滴 day 1 S-1 80mg,100mg,120mg/日 経口投与 day 1~14 【1コース3週】	●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬	中等度	◎ (注射)	8T/day2-4
胃癌	XELOX (胃癌)	エルプラット注 130mg/m ² 点滴 day 1 セロニダニド 2000mg/m ² /day 経口投与 day1~14 【1コース3週】	●セロニダニド⇒2週間投薬、1週間休薬	中等度	◎ (注射)	8T/day2-4
胃癌	wPTX(胃癌)	パクリタキセル注 80mg/m ² 点滴 day 1.8.15 【1コース4週】	アルコール過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用	軽度		
胃癌	S-1+wPTX	パクリタキセル注 50mg/m ² 点滴 day 1.8 S-1 80mg,100mg,120mg/日 経口投与 day1~14 【1コース3週】	アルコール過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 ●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬	軽度		
胃癌	アブラキサン (胃癌)	アブラキサン注 260mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週】	インラインフィルターは使用しないこと 特定生物由来製剤の同意書あり	軽度		
胃癌	triDOC(胃癌)	ドセタキセル注 60mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週】	アルコール過敏の有無を確認する事	軽度		

胃癌	triDOC+S-1 (Adj)	(第1コース) S-1 80mg/m ² /日 経口投与 day 1から14 (第2～7コース) ドセタキセル注 40mg/m ² 点滴 day 1 S-1 80mg/m ² /日 経口投与 day 1から14 【1コース3週】 (第8コース以降) S-1 80mg/m ² /日 経口投与 day 1から28 【1コース6週】 術後最長1年間	アルコール過敏の有無を確認する事 ●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬 (第1～7コース) ●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬 (第8コース以降)	軽度		
胃癌	ニボルマブ (胃)	オプジーボ240mg 点滴 day1 【1コース2週】	PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要!	最小度		
胃癌	weeklyアブラキサン	アブラキサン注 100mg/m ² 点滴 day 1.8.15 【1コース4週】	インラインフィルターは使用しないこと	軽度		
胃癌	Ramucirumab+weeklyアブラキサン	サイラムザ注 8mg/kg 点滴 day 1.15 アブラキサン注 100mg/m ² 点滴 day 1.8.15 【1コース4週】	インラインフィルターは使用しないこと	軽度		
胃癌	mFOLFOX6 (SV2.5)(胃癌)	レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day 1 エルプラット注 85mg/m ² 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day1 【1コース2週】		中等度		
胃癌	5-FU/ I – LV	レボホリナート注 250mg/m ² 点滴 day 1.8.15.22.29.36 5-FU注 (bolus) 600mg/m ² 点滴 day 1.8.15.22.29.36 【1コース8週】		軽度		
胃癌	FP (胃癌)	ランダ注 80mg/m ² 2時間点滴 day1 5-FU注 800mg/m ² 24時間持続点滴 day 1～5 【1コース3週】		高度	◎ (注射)	16T/day2-4

胃癌	FP+HER (初回用)	<p>ハーセチン注 8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降) day 1 ランダ注 80mg/m² 2時間点滴 day1 5-FU注 800mg/m² 24時間持続点滴 day 1~5 【1コース3週】</p>		高度	◎ (注射)	16T/day2-4
胃癌	FP+HER(2回目以降)	<p>ハーセチン注 8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降) day 1 ランダ注 80mg/m² 2時間点滴 day1 5-FU注 800mg/m² 24時間持続点滴 day 1~5 【1コース3週】</p>		高度	◎ (注射)	16T/day2-4
胃癌	CPT-11 (胃癌)	<p>カンプト注 150mg/m² 点滴 day1.15 【1コース 5週】</p>		中等度	◎ (注射)	8T/day2-4 8T/day16-18
胃癌	ニボルマブ (4週間隔)	<p>オプジーボ480mg 点滴 day1 【1コース4週】</p>	<p>PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要！</p>	最小度		