

癌種	プロトコール名	レジメン内容	注意事項	催吐リスク	イメンド	内服デカドロン
膵癌	アブラキサン+GEM (膵癌)	アブラキサン注 125mg/m ² 点滴 day 1.8.15 ジエムガール注 1000mg/m ² 点滴 day 1.8.15 【1コース4週】	インラインフィルターは使用しないこと ジエムガール注は1時間以上かけて投与しないこと (副作用増強のおそれ)	軽度		
膵癌	FOLFIRINOX(膵癌)	エルプラット注 85mg/m ² 点滴 day 1 レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day 1 カンプト注 150mg/m ² 点滴 day 1 5-FU注 (bolus) 400mg/m ² 点滴 day 1 5-FU(ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day1		高度	◎ (注射)	16T/day2-4
膵、胆道癌	S-1+GEM	ジエムガール注 1000mg/m ² 点滴 day 8.15 S-1 60mg/m ² /日 経口投与 day 1~14 【1コース3週】	ジエムガール注は1時間以上かけて投与しないこと (副作用増強のおそれ) ●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬	軽度		
膵	GEM (膵)	ジエムガール注 1000mg/m ² 点滴 day 1.8.15 【1コース4週】	ジエムガール注は1時間以上かけて投与しないこと (副作用増強のおそれ)	軽度		
胆道癌	GEM (胆道癌)	ジエムガール注 1000mg/m ² 点滴 day 1.8.15 【1コース6週】	ジエムガール注は1時間以上かけて投与しないこと (副作用増強のおそれ)	軽度		

胆道癌	GEM+CDDP (胆道癌)	ランダ注 25mg/m ² 点滴 day 1.8 ジエムガール注 1000mg/m ² 点滴 day 1.8 【1コース3週】	ジエムガール注は1時間以上かけて投与しないこと (副作用増強のおそれ)	高度	◎ (注射)	16T/day2-4 16T/day9-11
胆道癌	GEM+CDDP+S-1(胆道癌)	ランダ注 25mg/m ² 点滴 day 1 ジエムガール注 1000mg/m ² 点滴 day 1 S-1 80mg/m ² /日 経口投与 day 1から7 【1コース2週】	●S-1⇒1週間投薬、1週間休薬	高度	◎ (注射)	16T/day2-4
膵癌	オニバイド+5-FU/I-LV	オニバイド注 70mg/m ² 点滴 day1 レボレチン注 200mg/m ² 点滴 day1 5-FU (ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day1 【1コース2週】		中等度		