

癌種	プロトコル名	レジメン内容	注意事項	催吐リスク	イメンド	内服デカドロン
食道癌	CDDP+5-FU (食道癌)	ランダ注 80mg/m ² 2時間点滴 day1 5-FU注 800mg/m ² 24時間持続点滴 day 1~5 【1コース4週】		高度	◎	16T/day2-5
食道癌	CDDP+5-FU (食道癌 N A C)	ランダ注 80mg/m ² 2時間点滴 day1 5-FU注 800mg/m ² 24時間持続点滴 day 1~5 【1コース3週】 2コース		高度	◎	16T/day2-5
食道癌	CDGP+5-FU	アクブラ注 90mg/m ² 点滴 day 1 5-FU注 800mg/m ² 24時間点滴 day 1~5 【1コース 4週】		中等度	◎	8T/day2-5
食道癌	CDGP+DOC	ドセタキセル注 30mg/m ² 点滴 day 1 アクブラ注 40mg/m ² 点滴 day 1 【1コース2週】	アルコール過敏の有無を確認すること	中等度	◎	8T/day2-4
食道癌	分割DCF療法 (食道癌)	ドセタキセル注 30mg/m ² 1時間点滴 day1・15 ランダ注 80mg/m ² 2時間点滴 day1 5-FU注 800mg/m ² 24時間持続点滴 day 1~5 【1コース4週】		高度	◎	16T/day2-5
食道癌	triDOC (食道癌)	ドセタキセル注 70mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週】	アルコール過敏の有無を確認すること	軽度		
食道癌	wPTX(食道癌)	パクリタキセル注 100mg/m ² 点滴 day 1.8.15.22.29.36 【1コース7週】	アルコール過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用	軽度		