

癌種	プロトコル名	レジメン内容	注意事項	催吐リスク	イメンド	内服デカドロン
膀胱癌	GC療法	フラタ 750mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1.8.15 ランダ注 70mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 2 【1コース4週】	ジェムサー注は1時間以上かけて投与しないと (副作用増強のおそれ)	高度	◎ (注射)	16T/day3-5
膀胱癌	MVAC療法	メトトレキサート 50mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1.15.22 VLB 3mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 2.15.22 ADR 30mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 2 CDDP 70mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 2 【1コース4週】		高度	◎ (注射)	16T/day3-5
膀胱癌	BEP療法	ランダ注 20mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1~5 ラステット注 100mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1~5 プレオ 15mg 筋注 day 1 朝 プレオ 15mg 筋注 day 1 夕 【1コース3週】		高度	◎ (注射)	
膀胱癌	MEC療法	メトトレキサート 30mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1.15 ファルモルピシン 50mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 ランダ注 100mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 2 【1コース3週】		高度	◎ (注射)	16T/day3-5
膀胱癌	MEC療法 (CDDP分割投与)	メトトレキサート 30mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1.15 ファルモルピシン 50mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 ランダ注 50mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 2.3 【1コース3週】		高度	◎ (注射)	
前立腺癌	前立腺癌DOC (3W)	ドセタキセル注 70mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1 【1コース3週】	アルコール過敏の有無を確認する事	軽度		
前立腺癌	前立腺癌DOC (weekly)	ドセタキセル注 30mg/m <sup>2</sup> 点滴 day 1.8.15 【1コース4週】	アルコール過敏の有無を確認する事	軽度		

膀胱癌	ピルビン膀胱注	ピルビン20mg 膀胱内注入	TUR-BT手術当日 TUR-BT術後1日目 TUR-BT術後2日目以降			
膀胱癌	GC動注療法(両側)	ジエムガール注 1000mg/m <sup>2</sup> 動注 day 1.8.15 ランダ注 70mg/m <sup>2</sup> 動注 day 2 【1コース4週】	動注ポートより抗がん剤は投与 50mLのシリンジで払い出し	高度	◎ (注射)	
尿路上皮癌	ペムブロリズマブ (3週間隔) (尿路上皮癌)	キイトルーダ注 200mg 点滴 day1 【1コース3週】	PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを 使用 免疫関連の副作用チェック重要！	最小度		
尿路上皮癌	ペムブロリズマブ (6週間隔) (尿路上皮癌)	キイトルーダ注 400mg 点滴 day1 【1コース6週】	PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを 使用 免疫関連の副作用チェック重要！	最小度		