

癌種	プロトコル名	レジメン内容	注意事項	催吐リスク	Nk1受容体拮抗薬	内服デカドロン
乳癌	AC	エンドキサン注 600mg/m ² 点滴 day 1 アドリアシン注 60mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週 4サイクル】	エンドキサンの調製は閉鎖式器具を使用	高度	◎ イメンド125mg day1 イメンド80mg day2-3	8mg/day2-4
乳癌	dose-dense AC	エンドキサン注 600mg/m ² 点滴 day 1 アドリアシン注 60mg/m ² 点滴 day 1 【1コース2週 4サイクル】	エンドキサンの調製は閉鎖式器具を使用	高度	◎ イメンド125mg day1 イメンド80mg day2-3	8mg/day2-4
乳癌	TC	エンドキサン注 600mg/m ² 点滴 day 1 ドセタキセル注 75mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週、4サイクル】	エンドキサンの調製は閉鎖式器具を使用 アルコール過敏の有無を確認する事	中等度		8mg/day2-4
乳癌	triDOC (乳癌)	ドセタキセル注 60mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週】	アルコール過敏の有無を確認する事	軽度		8mg/day2-4
乳癌	CMF	エンドキサン錠 100mg/m ² 経口 day1~14 5-FU 600mg/m ² 点滴 day 1.8 メトトレキサート注 40mg/m ² 静注 day1.8 【1コース4週 6サイクル】	●エンドキサン⇒2週間投薬、2週休薬	中等度		
乳癌	CPT-11(乳癌)	イリリカ注 100mg/m ² 点滴 day 1.8.15.22 【1コース6週】		中等度		
乳癌	Docetaxel+GEM	ドセタキセル注 75mg/m ² 点滴 day 1 ゲムシタビン注 1250mg/m ² 点滴day 1.8 【1コース3週】	アルコール過敏の有無を確認する事	軽度		8mg/day2-4
乳癌	Docetaxel+HER	ドセタキセル注 60mg/m ² 点滴 day 1 トラスツズマブBS注 2mg/kg 点滴 day1.8.15 【1コース3週】	アルコール過敏の有無を確認する事 トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		8mg/day2-4
乳癌	FEC100(外来用)	エンドキサン注 500mg/m ² 点滴 day 1 ファルモルピシンRTU注 100mg/m ² 点滴 day 1 5-FU 500mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週、4~6サイクル】	エンドキサンの調製は閉鎖式器具を使用	中等度	◎ イメンド125mg day1 イメンド80mg day2-3	8mg/day2-4

乳癌	FEC100(入院用)	エンドキサン注 500mg/m ² 点滴 day 1 ファルモルピジンRTU注 100mg/m ² 点滴 day 1 5-FU 500mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週、4～6サイクル】	エンドキサンの調製は閉鎖式器具を使用	中等度	◎ イメンド125mg day1 イメンド80mg day2-3	8mg/day2-4
乳癌	FEC75 (外来用)	エンドキサン注 500mg/m ² 点滴 day 1 ファルモルピジンRTU注 75mg/m ² 点滴 day 1 5-FU 500mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週、4～6サイクル】	エンドキサンの調製は閉鎖式器具を使用	中等度	◎ イメンド125mg day1 イメンド80mg day2-3	8mg/day2-4
乳癌	FEC75 (入院用)	エンドキサン注 500mg/m ² 点滴 day 1 ファルモルピジンRTU注 75mg/m ² 点滴 day 1 5-FU 500mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週、4～6サイクル】	エンドキサンの調製は閉鎖式器具を使用	中等度	◎ イメンド125mg day1 イメンド80mg day2-3	8mg/day2-4
乳癌	GEM(乳癌)	ゲムシタピン注 1250mg/m ² 点滴 day 1.8 【1コース3週】		軽度		
乳癌	GEM+HER	ゲムシタピン注 1250mg/m ² 点滴 day 1.8 トラスツズマブ注 2mg/kg 点滴 day 1.8,15 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		
乳癌	PER+HER+DOC(乳癌) (初回用)	パージエタ注 840mg/body(初回投与時) 420mg/body(2回目以降) 点滴 day 1 トラスツズマブBS注 8mg/kg(初回投与時) 6mg/kg(2回目以降) 点滴 day 1 ドセタキセル注 75mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。 アルコール過敏の有無を確認する事	軽度		8mg/day2-4
乳癌	PER+HER+DOC(乳癌) (2回目以降)	パージエタ注 840mg/body(初回投与時) 420mg/body(2回目以降) 点滴 day 1 トラスツズマブBS注 8mg/kg(初回投与時) 6mg/kg(2回目以降) 点滴 day 1 ドセタキセル注 75mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。 アルコール過敏の有無を確認する事	軽度		8mg/day2-4
乳癌	PER+HER+wPTX(乳癌) (初回用)	パージエタ注 840mg/body(初回投与時) 420mg/body(2回目以降) 点滴 day 1 トラスツズマブBS注 8mg/kg(初回投与時) 6mg/kg(2回目以降) 点滴 day 1 パクリタキセル注 80mg/m ² 点滴 day 1,8,15 【1コース3週】	アルコール過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		

乳癌	PER+HER+wPTX(乳癌) (2回目以降)	パージェタ注 840mg/body(初回投与時) 420mg/body(2回目以降) 点滴 day 1 トラスツズマブBS注 8mg/kg(初回投与時) 6mg/kg(2回目以降) 点滴 day 1 パクリタキセル注 80mg/m ² 点滴 day 1,8,15 【1コース3週】	アレルギー過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		
乳癌	PER+HER(乳癌) (maintenance)	パージェタ注420mg/body(2回目以降) 点滴 day 1 トラスツズマブBS注 6mg/kg(2回目以降) 点滴 day 1 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	最小度		
乳癌	triHER(Adj) (初回用)	トラスツズマブBS注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		
乳癌	triHER(Adj)(2回目以降)	トラスツズマブBS注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		
乳癌	VNB	ナベルピン注 25mg/m ² 点滴 day1.8 【1コース3週】		軽度		
乳癌	VNB+triHER (初回用)	ナベルピン注 25mg/m ² 点滴 day1.8 トラスツズマブBS注 8mg/kg(初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		
乳癌	VNB+triHER(2回目以降)	ナベルピン注 25mg/m ² 点滴 day1.8 トラスツズマブBS注 8mg/kg(初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		
乳癌	wHER (乳癌) (初回用)	トラスツズマブBS注 4mg/kg(初回投与時) 2mg/kg (2回目以降) 点滴 day 1 【1コース1週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		
乳癌	wHER (乳癌) (2回目以降)	トラスツズマブBS注 4mg/kg(初回投与時) 2mg/kg (2回目以降) 点滴 day 1 【1コース1週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		

乳癌	wPTX (乳癌)	パクリタキセル注 80mg/m ² 点滴 day 1.8.15 【1コース4週】	アレルギー過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用	軽度		
乳癌	wPTX+Bevacizumab	パクリタキセル注 90mg/m ² 点滴 day 1.8.15 ペバシズマブBS注 10mg/kg 点滴 day 1.15 【1コース4週】	アレルギー過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 ペバシズマブBSは初回投与90分、忍容性が良好であれば 2回目60分、それ以降30分での投与可	軽度		
乳癌	wPTX+HER	パクリタキセル注 80mg/m ² 点滴 day 1.8.15 トラスツズマブBS注 2mg/kg 点滴 day 1.8.15.22 【1コース4週】	アレルギー過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 トラスツズマブBSは初回投与时90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		
乳癌	wPTX+HER(NAC) (初回用)	パクリタキセル注 80mg/m ² 点滴 day 1 トラスツズマブBS注 4mg/kg(初回投与时) 2mg/kg (2回目以降) 点滴 day 1 【1コース1週】	アレルギー過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 トラスツズマブBSは初回投与时90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		
乳癌	wPTX+HER(NAC)(2回目以降)	パクリタキセル注 80mg/m ² 点滴 day 1 トラスツズマブBS注 4mg/kg(初回投与时) 2mg/kg (2回目以降) 点滴 day 1 【1コース1週】	アレルギー過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 トラスツズマブBSは初回投与时90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		
乳癌	wPTX-NAC	パクリタキセル注 80mg/m ² 点滴 day 1 【1コース1週】	アレルギー過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用	軽度		
乳癌	アブラキサン(乳癌)	アブラキサン注 260mg /m ² 点滴 day 1 【1コース3週】	インラインフィルターは使用しないこと 特定生物由来製剤の同意書あり	軽度		
乳癌	アブラキサン (HER)tri (初回用)	アブラキサン注260mg/m ² 点滴 day 1 トラスツズマブBS注 8mg/kg(初回投与时) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day 1 【1コース3週】	インラインフィルターは使用しないこと 特定生物由来製剤の同意書あり トラスツズマブBSは初回投与时90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		
乳癌	アブラキサン (HER)tri (2回目以降)	アブラキサン注260mg/m ² 点滴 day 1 トラスツズマブBS注 8mg/kg(初回投与时) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day 1 【1コース3週】	インラインフィルターは使用しないこと 特定生物由来製剤の同意書あり トラスツズマブBSは初回投与时90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		

乳癌	カドサイラ (乳癌)	カドサイラ 3.6mg/kg 点滴 day 1 【1コース3週】	カドサイラは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。 PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用	軽度		
乳癌	ハラヴェン	ハラヴェン 1.4mg/m ² 静注 day 1.8 【1コース3週】		軽度		
乳癌	ハラヴェン+HER (初回用)	ハラヴェン 1.4mg/m ² 静注 day 1.8 トラスツズマブBS注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day 1 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		
乳癌	ハラヴェン+HER (2回目以降)	ハラヴェン 1.4mg/m ² 静注 day 1.8 トラスツズマブBS注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day 1 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	軽度		
乳癌	triDOC (乳癌) (NAC)(Adj)	ドセタキセル注 75mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週】	アレルギー過敏の有無を確認する事	軽度		8mg/day2-4
乳癌	テセントリク+アブラキサン	テセントリク注:840mg/body day1・15 アブラキサン注:100mg/m ² day1・8・15 【1コース4週】	インラインフィルターの使用について、薬剤で異なるため注意！！ テセントリク：0.22μ以下のインラインフィルターを使用する アブラキサン：使用しない テセントリクは初回投与60分、忍容性が良好であれば2回目 以降30分での投与可 それ以降30分間の投与可 (但し、インフュージョンリアクション等症状出た場合、医師に投 与時間確認すること) アブラキサンは特定生物由来製剤の同意書が必要です	軽度		
乳癌	ペムブロリズマブ+PTX+CBDCA	カルボプラチン：AUC 1.5 1週間間隔 12連投 バクリタキセル：80mg/m ² 1週間間隔 12連投 ペムブロリズマブ 200mg/body 3週に1回 【1コース3週 4サイクル】	アレルギー過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要！	中等度		
乳癌	ペムブロリズマブ+AC	エンドキサン注 600mg/m ² 点滴 day 1 アドリアシン注 60mg/m ² 点滴 day 1 ペムブロリズマブ 200mg/body 3週に1回 【1コース3週 4サイクル】	エンドキサンの調製は閉鎖式器具を使用	高度	◎ イメンド125mg day1 イメンド80mg day2-3	

乳癌	Trastuzumab Deruxtecan	エンハーツ注 5.4mg/kg 点滴 day1 【1コース3週】	PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要！ 遮光カバーをして投与	中等度		
乳癌	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注 200mg/body 点滴 day1 【1コース3週 9サイクル】	PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要！	最小度		
乳癌	フェスゴIN (PER+HER) +DOC (初回用)	フェスゴ [®] 配合皮下注IN(PER1200mg、HER600mg) 皮下注 day1 ドセタセル注 75mg/m ² day1 【1コース3週】	フェスゴINは8分以上かけて投与すること アルコール過敏の有無を確認する事	軽度		8mg/day2-4
乳癌	フェスゴMA (PER+HER) +DOC (2回目以降)	フェスゴ [®] 配合皮下注MA(PER600mg、HER600mg) 皮下注 day1 ドセタセル注 75mg/m ² 点滴 day1 【1コース3週】	フェスゴMAは5分以上かけて投与すること アルコール過敏の有無を確認する事 ※術前・術後薬物療法の場合の投与期間は12ヶ月	軽度		8mg/day2-4
乳癌	フェスゴIN (PER+HER) +wPTX(12連投) (初回用)	フェスゴ [®] 配合皮下注IN(PER1200mg、HER600mg) 皮下注 day1 パクリタセル注:80mg/m ² day1・8・15・・・(12回連続) 【1コース3週】	フェスゴINは8分以上かけて投与すること アルコール過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用	軽度		
乳癌	フェスゴMA (PER+HER) +wPTX(12連投) (2回目以降)	フェスゴ [®] 配合皮下注MA(PER600mg、HER600mg) 皮下注 day1 パクリタセル注:80mg/m ² 点滴 day1・8・15・・・(12回連続) 【1コース3週】	フェスゴMAは5分以上かけて投与すること アルコール過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 ※術前・術後薬物療法の場合の投与期間は12ヶ月	軽度		
乳癌	フェスゴIN (PER+HER) (maintenabce) (初回用)	フェスゴ [®] 配合皮下注IN(PER1200mg、HER600mg) 皮下注 day1 【1コース3週】	フェスゴINは8分以上かけて投与すること	最小度		
乳癌	フェスゴMA (PER+HER) (maintenabce) (2回目以降)	フェスゴ [®] 配合皮下注MA(PER600mg、HER600mg)皮下注 day1 【1コース3週】	フェスゴMAは5分以上かけて投与すること ※術前・術後薬物療法の場合の投与期間は12ヶ月	最小度		
乳癌	ペムブロリズマブ+CBDCA+GEM	カルボプラチン：AUC 2 点滴 day1,8 ゲムシタピン：1000mg/m ² 点滴 day1,8 キイトルーダ注 200mg/body 点滴 day1 【3週1コース】	アルコール過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 ゲムシタピン注は1時間以上かけて投与しないこと (副作用増強のおそれ) 免疫関連の副作用チェック重要！	中等度		

乳癌	ペムブロリズマブ+アブラキサン	キイトルーダ:200mg/body 点滴 day1【1コース3週】 アブラキサン:100mg/m ² day1,8,15 点滴【1コース4週】 →上記2剤の複合レジメン	インラインフィルターの使用について、薬剤で異なるため注意！！ ペムブロリズマブ：0.22μ以下のインラインフィルターを使用する アブラキサン：使用しない アブラキサンは特定生物由来製剤の同意書が必要です 免疫関連の副作用チェック重要！	軽度		
乳癌	ペムブロリズマブ+PTX	キイトルーダ:200mg/body 点滴 day1【1コース3週】 パクリタキセル:90mg/m ² day1,8,15点滴【1コース4週】 →上記2剤の複合レジメン	アルコール過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要！	軽度		