

癌種	プロトコル名	レジメン内容	注意事項	催吐リスク	Nk1受容体拮抗薬	内服デカドロン
胃癌	CPT-11+CDDP 入院用	イリテカ注 70mg/m ² 点滴 day1.15 シスプラチン注 80mg/m ² 点滴 day 1 【1コース4週】	day15はイリテカ注のみ、 支持療法薬剤異なります。注意！	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4 8mg/day16-18
胃癌	CPT-11+CDDP 外来用	イリテカ注 60mg/m ² 点滴 day 1 シスプラチン注 30mg/m ² 点滴 day 1 【1コース2週】		高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
胃癌	IRIS (胃癌)	イリテカ注 100mg/m ² 点滴 day1.15 S-1 80mg/m ² /日 経口投与 day1~14 【1コース4週】	●S-1⇒2週間投薬、2週間休薬	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4 4mg/day16-18
胃癌	S-1+CDDP+HER (低負荷) (初回用)	トラスツマブBS注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 シスプラチン注 60mg/m ² 点滴 day 1 S-1 80mg,100mg,120mg/日 経口投与 day1から14 【1コース3週】	トラスツマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。 腎機能が保たれていることを確認すること。 Day2-3は1000cc以上の水分摂取をして いただく事 ●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
胃癌	S-1+CDDP+HER (低負荷) (2回目以降)	トラスツマブBS注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 シスプラチン注 60mg/m ² 点滴 day 1 S-1 80mg,100mg,120mg/日 経口投与 day1から14 【1コース3週】	トラスツマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。 腎機能が保たれていることを確認すること。 Day2-3は1000cc以上の水分摂取をして いただく事 ●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
胃癌	S-1+CDDP+HER (初回用)	トラスツマブBS注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 シスプラチン注 60mg/m ² 点滴 day 1 S-1 80mg,100mg,120mg/日 経口投与 day1から14 【1コース3週】	トラスツマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。 ●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
胃癌	S-1+CDDP+HER (2回目以降)	トラスツマブBS注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 シスプラチン注 60mg/m ² 点滴 day 1 S-1 80mg,100mg,120mg/日 経口投与 day1から14 【1コース3週】	トラスツマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。 ●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
胃癌	S-1+CDDP	シスプラチン注 60mg/m ² 点滴 day 8 S-1 80mg,100mg,120mg/日 day 1~21 【1コース5週】	●S-1⇒3週間投薬、2週間休薬	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4

胃癌	S-1+CDDP (低負荷)	シスプラチン注 60mg/m ² 点滴 day 8 S-1 80mg,100mg,120mg/日 day 1~21 【1コース5週】	腎機能が保たれていることを確認すること。 Day9-10は1000cc以上の水分摂取をして いただく事 ●S-1⇒3週間投薬、2週間休薬	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
胃癌	XP+triHER(胃癌) (初回用)	トラスツズマブBS注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 シスプラチン注 80mg/m ² 点滴 day 1 カベシタビン錠 2000mg/m ² /日 経口投与 day1~14 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。 ●カベシタビン⇒2週間投薬、1週間休薬	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
胃癌	XP+triHER(胃癌) (2回目以降)	トラスツズマブBS注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 シスプラチン注 80mg/m ² 点滴 day 1 カベシタビン錠 2000mg/m ² /日 経口投与 day1~14 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。 ●カベシタビン⇒2週間投薬、1週間休薬	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
胃癌	XP(胃癌)	シスプラチン注 80mg/m ² 点滴 day 1 カベシタビン錠 2000mg/m ² /日 経口投与 day 1~14 【1コース3週】	●カベシタビン⇒2週間投薬、1週間休薬	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
胃癌	triHER(胃癌) (初回用)	トラスツズマブBS注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	最小度		
胃癌	triHER(胃癌) (2回目以降)	トラスツズマブBS注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。	最小度		
胃癌	FP (胃癌)	シスプラチン注 80mg/m ² 2時間点滴 day1 5-FU注 800mg/m ² 24時間持続点滴 day 1~5 【1コース3週】		高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
胃癌	FP+HER (初回用)	トラスツズマブBS注 8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降) day 1 シスプラチン注 80mg/m ² 2時間点滴 day1 5-FU注 800mg/m ² 24時間持続点滴 day 1~5 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。 腎機能が保たれていることを確認すること。 Day2-3は1000cc以上の水分摂取をして いただく事	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
胃癌	FP+HER(2回目以降)	トラスツズマブBS注 8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降) day 1 シスプラチン注 80mg/m ² 2時間点滴 day1 5-FU注 800mg/m ² 24時間持続点滴 day 1~5 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分 まで短縮できる。 腎機能が保たれていることを確認すること。 Day2-3は1000cc以上の水分摂取をして いただく事	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4

胃癌	SOX(胃癌)	林カリア®ラチ注 100mg/m ² 点滴 day 1 S-1 80mg,100mg,120mg/日 経口投与 day 1~14 【1コース3週】	●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
胃癌	SOX+HER (初回用)	トラスツズマブBS注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 林カリア®ラチ注 100mg/m ² 点滴 day 1 S-1 80mg,100mg,120mg/日 経口投与 day 1~14 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。 ●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
胃癌	SOX+HER (2回目以降)	トラスツズマブBS注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 林カリア®ラチ注 100mg/m ² 点滴 day 1 S-1 80mg,100mg,120mg/日 経口投与 day 1~14 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。 ●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
胃癌	ニボルマブ+SOX(胃癌)	オブジーボ注 360mg 点滴 day1 林カリア®ラチ注 100mg/m ² 点滴 day 1 S-1 80mg,100mg,120mg/日 経口投与 day 1~14 【1コース3週】	●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬 0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること 免疫関連の副作用チェック重要！	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
胃癌	CAPOX (胃癌)	林カリア®ラチ注 130mg/m ² 点滴 day 1 カベシタピン錠 2000mg/m ² /day 経口投与 day1~14 【1コース3週】	●カベシタピン⇒2週間投薬、1週間休薬	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
胃癌	CAPOX+HER (初回用)	トラスツズマブBS注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 林カリア®ラチ注 130mg/m ² 点滴 day 1 カベシタピン錠 2000mg/m ² /day 経口投与 day1~14 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。 ●カベシタピン⇒2週間投薬、1週間休薬	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
胃癌	CAPOX+HER (2回目以降)	トラスツズマブBS注 8mg/kg (初回投与時) 6mg/kg (2回目以降) 点滴 day1 林カリア®ラチ注 130mg/m ² 点滴 day 1 カベシタピン錠 2000mg/m ² /day 経口投与 day1~14 【1コース3週】	トラスツズマブBSは初回投与時90分かけて投与すること。 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。 ●カベシタピン⇒2週間投薬、1週間休薬	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
胃癌	ニボルマブ+CAPOX (胃癌)	オブジーボ注 360mg 点滴 day1 林カリア®ラチ注 130mg/m ² 点滴 day 1 カベシタピン錠 2000mg/m ² /day 経口投与 day1~14 【1コース3週】	●カベシタピン⇒2週間投薬、1週間休薬 0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること 免疫関連の副作用チェック重要！	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
胃癌	CAPOX+ゾルベルツキシマブ (初回用)	ヒ®注 800mg/m ² (初回) 林カリア®ラチ注:130mg/m ² day1 カベシタピン錠:2000mg/m ² /day 経口投与 day1-14 【11-13週】	PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること ピロイは体表面積で投与開始時の投与速度が変化] 投与中の忍容性が良好なら、投与開始60分後以降から、 徐々に投与速度を上げること可能 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分以降から投与速度を上げること可能 ●カベシタピン⇒2週間投薬、1週間休薬	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4

胃癌	CAPOX+ゾルベルツキシマブ (2回目以降)	ビ`04注 600mg/m ² オキサリプラチン注:130mg/m ² day1 カベシタピン錠:2000mg/m ² /day 経口投与 day1-14 【1コ-3週】	PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること ビロイは体表面積で投与開始時の投与速度が変化] 投与中の忍容性が良好なら、投与開始60分後以降から、 徐々に投与速度を上げること可能 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分以降 から投与速度を上げること可能 ●カベシタピン⇒2週間投薬、1週間休業	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
胃癌	mFOLFOX6 (SV2.5)(胃癌)	レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day 1 オキサリプラチン注 85mg/m ² 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day1 【1コース2週】		中等度		
胃癌	ニボルマブ+ mFOLFOX6 (SV2.5)(胃癌)	オプジーボ注 240mg 点滴 day1 レボホリナート注 200mg/m ² 点滴 day 1 オキサリプラチン注 85mg/m ² 点滴 day 1 5-FU注 (ポンプ) 2400mg/m ² 46時間 day1 【1コース2週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること 免疫関連の副作用チェック重要！	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4
胃癌	mFOLFOX+ゾルベルツキシマブ (初回用)	ビ`04注 800mg/m ² レボホリナート注:200mg/m ² day1 オキサリプラチン注:85mg/m ² day1 5-FU注:400mg/m ² (急速) day1 5-FU注:2400mg/m ² (持続) 46時間 【1コ-2週】	PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること ビロイは体表面積で投与開始時の投与速度が変化 投与中の忍容性が良好なら、投与開始60分後以降から、 徐々に投与速度を上げること可能 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分以降 から投与速度を上げること可能	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
胃癌	mFOLFOX+ゾルベルツキシマブ (2回目以降)	ビ`04注：400mg/m ² レボホリナート注:200mg/m ² day1 オキサリプラチン注:85mg/m ² day1 5-FU注:400mg/m ² (急速) day1 5-FU注:2400mg/m ² (持続) 46時間 【1コ-2週】	PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること ビロイは体表面積で投与開始時の投与速度が変化 投与中の忍容性が良好なら、投与開始60分後以降から、 徐々に投与速度を上げること可能 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分以降 から投与速度を上げること可能	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4
胃癌	RAM (胃癌)	サイラムザ注 8mg/kg 点滴 day1 【1コース2週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること	最小度		
胃癌	RAM+PTX (胃癌)	サイラムザ注 8mg/kg 点滴 day 1.15 パクリタキセル注 80mg/m ² 点滴 day 1.8.15 【1コース4週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること アレルギー過敏の有無を確認すること	軽度		
胃癌	RAM+IRI (胃癌)	サイラムザ注 8mg/kg 点滴 day 1.15 イリノテカン注 150mg/m ² 点滴 day1.15 【1コース4週】	0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること	中等度	◎ (注射：アロカリス)	4mg/day2-4 4mg/day16-18

胃癌	Ramucirumab+weeklyアブラキサン	サイラムザ注 8mg/kg 点滴 day 1.15 アブラキサン注 100mg/m ² 点滴 day 1.8.15 【1コース4週】	インラインフィルターは使用しないこと	軽度		
胃癌	wPTX(胃癌)	パクリタキセル注 80mg/m ² 点滴 day 1.8.15 【1コース4週】	アルコール過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用	軽度		
胃癌	S-1+wPTX	パクリタキセル注 50mg/m ² 点滴 day 1.8 S-1 80mg,100mg,120mg/日 経口投与 day1~14 【1コース3週】	アルコール過敏の有無を確認すること PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 ●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬	軽度		
胃癌	アブラキサン(胃癌)	アブラキサン注 260mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週】	インラインフィルターは使用しないこと 特定生物由来製剤の同意書あり	軽度		
胃癌	weeklyアブラキサン	アブラキサン注 100mg/m ² 点滴 day 1.8.15 【1コース4週】	インラインフィルターは使用しないこと	軽度		
胃癌	triDOC(胃癌)	ドセタキセル注 60mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週】	アルコール過敏の有無を確認する事	軽度		
胃癌	triDOC+S-1 (Adj)	(第1コース) S-1 80mg/m ² /日 経口投与 day 1から14 (第2~7コース) ドセタキセル注 40mg/m ² 点滴 day 1 S-1 80mg/m ² /日 経口投与 day 1から14 【1コース3週】 (第8コース以降) S-1 80mg/m ² /日 経口投与 day 1から28 【1コース6週】 術後最長1年間	アルコール過敏の有無を確認する事 ●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬 <u>(第1~7コース)</u> ●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬 <u>(第8コース以降)</u>	軽度		
胃癌	5-FU/ I – LV	レボホリナート注 250mg/m ² 点滴 day 1.8.15.22.29.36 5-FU注 (bolus) 600mg/m ² 点滴 day 1.8.15.22.29.36 【1コース8週】		軽度		
胃癌	CPT-11(胃癌)	イリリカ注 150mg/m ² 点滴 day1.15 【1コース5週】		中等度	◎ (注射:アロカリス)	4mg/day2-4 4mg/day16-18
胃癌	Trastuzumab Deruxtecan	トラズテマ注 6.4mg/kg 点滴 day1 【1コース3週】	PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要! 遮光カバーをして投与 ※当院では高度催吐リスク対応	中等度	◎ (注射:アロカリス)	
胃癌	ニボルマブ(2週間隔)	オプジーブ240mg 点滴 day1 【1コース2週】	PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要!	最小度		

胃癌	ニボルマブ [®] (4週間隔)	オプジーボ注 480mg 点滴 day1 【1コース4週】	PVCフリー/0.22μ以下のインラインフィルターを使用 免疫関連の副作用チェック重要！	最小度		
----	---------------------------	----------------------------------	---	-----	--	--