

癌種	プロトコール名	レジメン内容	注意事項	催吐リスク	Nk1受容体拮抗薬	内服デカドロン
肺癌	CBDCA+PEM(肺癌)	ペムトレキセド注 500mg/m ² 点滴 day 1 カルボプラチン注 AUC=5 点滴 day 1 【1コース3週 4サイクル】	ペムトレキセド毒性軽減の為、 ●メチコバル注 (VB12) 筋注 アリムタ投与開始 1週間前から9週毎に投与 (全コース終了22日目まで) ●バンピタン末 (葉酸) 1g/日 経口投与 ペムトレキセド投与開始1週間前から連日 (全コース終了22日目まで)	中等度		
肺癌	Bev+CBDCA+PEM(肺がん)	ペムトレキセド注 500mg/m ² 点滴 day 1 カルボプラチン注 AUC=5 点滴 day 1 ペバシズマブBS注 15mg/kg 点滴 day 1 【1コース3週 4~6サイクル】	ペムトレキセド毒性軽減の為、 ●メチコバル注 (VB12) 筋注 アリムタ投与開始 1週間前から9週毎に投与 (全コース終了22日目まで) ●バンピタン末 (葉酸) 1g/日 経口投与 ペムトレキセド投与開始1週間前から連日 (全コース終了22日目まで)	中等度		
悪性胸膜中皮腫	CDDP+PEM (悪性胸膜中皮腫)	ペムトレキセド注 500mg/m ² 点滴 day 1 シスプラチン注 75mg/m ² 点滴 day 1 【1コース3週 4サイクル】	ペムトレキセド毒性軽減の為、 ●メチコバル注 (VB12) 筋注 アリムタ投与開始 1週間前から9週毎に投与 (全コース終了22日目まで) ●バンピタン末 (葉酸) 1g/日 経口投与 ペムトレキセド投与開始1週間前から連日 (全コース終了22日目まで)	高度	◎ (注射：アロカリス)	8mg/day2-4